

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Ruhsat Tarih ve No : 16.03.2011 / 8250

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULMA DOZU	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Hıyar	Kabakgillerde Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	50 g/100 L su	3 gün
Bağ*	Bağ mildiyösü (<i>Plasmopara viticola</i>)	60 g/100 L su	7 gün
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	50 g/da	3 gün

(*):Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ikarışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasının sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Uygulama sırasında bitki en iyi şekilde yıkanmalı, yaprakların alt ve üst yüzeylerinin iyice ıslanması sağlanmalıdır. Uygulama havanın serin ve sakin zamanlarında yapılmalıdır.

Hıyar Mildiyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında ve ya çevrede ilk mildiyö belirtilerinin görülmesi ile başlanır. 5 gün ara ile en az iki uygulama yapılır.

Bağda Mildiyö: Birinci uygulama sürgünler 25-30 cm boyunda iken yapılmalıdır. İkinci ve üçüncü uygulamalar bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 12 gün arayla uygulanmalıdır. Şayet meteorolojik şartlar hastalığın çıkışına uygun gider ve uygulamanın devamına gerek duyulursa 4. ve 5. Uygulamalar da yapılmalıdır.

Patates mildiyösü: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

CAPSELON 50 WP isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre **grubu 27** olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **CAPSELON 50 WP'nin** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 27** harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

ASTRANOVA

CAPSELON 50 WP

SUDA ISLANABİLİR TOZ (WP) ✓

GRUP	27	FUNGİSİT
------	----	----------

% 50 Cymoxanil ✓

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 7 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik ve terleme.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz. Temas halinde deriyi sabunla yıkayınız. Yutulursa kusturunuz, teneffüs edilmişse hastayı derhal bulaşık sahadan uzaklaştırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) : 114

19 Kasım 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı :
Şarj No :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

İÇİNDEKİLER: Cymoxanil

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayınız.

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P391 Döküntüleri toplayınız.

P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ASTRANOVA
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ANTALYA
Çağlayan Mh. Eski Zeytin Çiğdem Sok. Kaplan Apt. /pt.
No: 1/5 - Muratpaşa / ANTALYA

Emine CEYLAN GÜNEŞ



KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında bir çok bitki koruma ürünü ile karışabilir. Ancak geniş çaptaki bir karışımdan önce fiziksel karışabilirliğin mümkün olup olmadığı, küçük çapta bir karışımla denenmelidir.



ASTRANOVA

CAPSELON 50 WP

SUDA ISLANABİLİR TOZ (WP)

GRUP	27	FUNGİSİT
------	----	----------

% 50 Cymoxanil

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajını herhangi bir amaç için kullanmayınız.
- Boş ambalajları ya da bitki koruma ürününün fazlasını toprak ve su kaynaklarından uzak bir yere gömünüz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA

ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.

MERKEZ: Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok.

Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa / ANTALYA

Tel: + 90 242 324 75 10-11 Faks: + 90 242 324 75 12

FABRİKA: BOR Karma Organize Sanayi Bölgesi

Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km 4 Nolu Yol No: 10 Bor / NIĞDE

Tel: +90 (388) 315 00 74-75 / Faks: +90 (388) 315 00 73



Emine CEYLAN GÜNEŞ

19 Kasım 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Yunus Bayram
Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

