

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Ruhsat Tarih Ve No : 03.06.2010 / 7761

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Ayrıceği Pamuk Soğan Patates	Tilkikuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )	500 ml/da
	Horozibiği ( <i>Amaranthus albus</i> )	
	Farekulağı ( <i>Anagallis arvensis</i> )	
	Rüzgar otu ( <i>Apera spicaventi</i> )	
	Kara pazı ( <i>Atriplex patula</i> )	
	Çobançantası ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> )	
	Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )	
	Bambul otu ( <i>Chrozophora tinctoria</i> )	
	Çatal otu ( <i>Digitaria sanguinalis</i> )	
	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	
	Sütleğen ( <i>Euphorbia spp.</i> )	500 ml/da
	Boz ot ( <i>Heliotropium europaeum</i> )	
	Ballıbaba ( <i>Lamium amplexicaule</i> )	
	Papatya ( <i>Matricaria spp.</i> )	
	Gelincik ( <i>Papaver rhoeas</i> )	
	Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> )	
	Çobanedeğneği ( <i>Polygonum spp.</i> )	
	Çayır salkım otu ( <i>Poa pratensis</i> )	
	Kirpi darı ( <i>Setaria spp.</i> )	
	Yapışkan ot ( <i>Setaria verticillata</i> )	
Bülbül otu ( <i>Sisymbrium officinale</i> )		
Kuş otu ( <i>Stelleria media</i> )		
Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> )		
Kanyaş / Geliç ( <i>Sorghum halepense</i> ) Tohumdan		
Tarla akça çiçeği ( <i>Thlaspi arvense</i> )		
İsırgan otu ( <i>Urtica urens</i> )		
Mısır Domates	Horozibiği ( <i>Amaranthus albus</i> )	
	Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )	
	Bambul otu ( <i>Chrozophora tinctoria</i> )	
	Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> )	
Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> )		

Not: Çok kumlu toprakta yetişen bitkilerde kullanmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakiler karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarını yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



## AMİD 330 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU K1:3 HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)

330 g/l Pendimethalin

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Gözlerde ve deride tahriş, kan hücumu, ateş yapar.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Soluma sonrası:** Karışım solunmuş ise, kişi temiz havaya çıkarılmalı, solumuyor ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solumada güçlük var ise, oksijen verilmelidir. Acilen hekim çağırılarak girişimde bulunulmalıdır.

**Cilt teması sonrası:** Karışım cilde temas durumunda bulaşmış giysi ve ayakkabılarınızı çıkarın, bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır.

**Göz teması sonrası:** Karışımın göze temas etmesi durumunda acilen bol su ile en az 15 dakika yıkayınız.

**Yutma sonrası:** Yutulmuş ise, acilen tıbbi yardım almasını sağlayın. Bilinç kapalı ise asla bir şey vermeyin.

### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirmlere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Dr. Necrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı

Net Miktarı :  
Azami Perakende Satış Fiyatı :  
Şarj No :

İÇİNDEKİLER: Pendimethalin

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

- H226** Alevlenir sıvı ve buhar.
- H312** Cilt ile teması halinde zararlıdır.
- H315** Cilt tahrişine yol açar.
- H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

- P210** Isıdan/kvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- P264** Elleçlemeden sonra ellerinizi bol su ve sabun ile iyice yıkayın.
- P273** Çevreye verilmesinden kaçınınız.
- P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P333+P313** Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P403+P235** İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.
- P501** Döküntüleri toplayın.
- P501** İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.
- EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- AMİD 330 EC** birçok toprak etkili herbisitlerden daha etkili olmasına rağmen bir miktar toprak rutubeti bitki koruma ürününün etkisinin tam olması için gereklidir.
- %10'dan fazla organik madde içeren topraklarda kullanıldığında ot kontrolünde azalma olabilir.
- Yüzey sulanının biriktiği yerlerde kullanılmamalıdır.
- AMİD 330 EC** hastalık, kuraklık, aşırı doz uygulaması yetersiz toprak hazırlığı gibi nedenlerden ötürü zayıf ve stresli durumda olan bitkilerde kullanılmamalıdır.
- AMİD 330 EC** çok yıllık yabancı otları kontrol etmez.
- Sıvı ve buharı tutuşabilir.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Boş kapları başka bir amaçla kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- 5 °C'nin altında ve +35 °C'nin üstünde depolamayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme dönemi kullanmayınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR  
10 Subat 2021

ASTRANOVA  
TAR. İÇ. VE SAN. A.Ş.  
Antalya Kurumları D.: 091 050 9162  
Çağlayan Mh. Eski Lara Yolu 296 Sk. Kaplan Apt.  
No: 1/5 - Muratpaşa - ANTALYA

Emine CEYLAN GÜNEŞ

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

**Pamuk ve Ayçiçeğinde:** En iyi sonuç **AMİD 330 EC**'nin toprağa karıştırılarak kullanılmasıyla elde edilir. Uygulama ekimden 7 gün öncesine kadar yapılabilir. Tarla keseksiz ve iyi hazırlanmış olmalıdır. Uygulamadan sonraki 4 gün içinde toprağa karıştırma işlemi 5-8 cm derinliğinde, disk, rototiller veya tirmik ile yapılmalıdır. Uygulamadan sonraki 4 gün içerisinde 10 mm yağış düşerse toprağa karıştırma zorunlu değildir. Pamukta bir uygulama şeklinde, ekimi takip eden 5 gün içinde çıkış öncesi uygulanmalıdır.

**Patates, Mısır, Soğan ve Fideden Yetiştirilen Domateslerde:** **AMİD 330 EC** bu bitkilerde tohum ekim sonrası-bitki çıkış öncesi olarak toprak yüzeyine uygulanır. Tohum ekim derinliği 4-5 cm olmalıdır. Patates ve yabancı otların çıkışına önceki dönemde uygulanmalıdır. Mısır'da, **AMİD 330 EC** kesinlikle toprağa karıştırılmaz ve kesinlikle şeker mısırında kullanılmaz. Tohum üretimi için ekilen mısır sahalanında kullanmadan Firma yetkililerine danışınız. Soğanda çıkış öncesi kullanılabileceği gibi soğanın iki yapraklı döneminden sonrada kullanılabilir. Ancak otlar 1-2 yaprak devresini geçmeden uygulanmalıdır. Domates fiderleri, uygulamayı takiben 2. ve 6. günler arasında dikilmelidir. Fide dikimi sırasında bitki koruma ürünüyle bulaşık toprak tabakasının köklere temas etmemesine dikkat edilmelidir.

**NOT: KURAK ŞARTLARDA AMİD 330 EC UYGULAMASINI TAKİP EDEN 3-7 GÜN İÇİNDE 5-10 mm SULAMA YAPILMALIDIR.**

### Münavebe Bitkileri

**AMİD 330 EC** ile uygulamadan, 6 ay sonrasına kadar aşağıda belirtilen bitkilerden başkası rotasyona giremez. Pamuk, Fasulye, Bezelye, Mısır, Soya Fasulyesi, Yerfıstığı, Ayçiçeği ve şaşırtılan bitkiler. Herhangi bir nedenle ekilen kültür bitkisi bozulduğunda, toprak en az 15 cm derinliğinde işlenerek Patates, Fasulye, Yazlık hububat, Mısır, Pamuk, Soya Fasulyesi, Bezelye ekilebilir. Mısır, Fasulye ve Bezelye toprak işleme yapılmadan en az 5 cm derinlikte olması kaydı ile eklenebilir.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

**AMİD 330 EC** adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre **K1:3 Grubu** olarak sınıflandırılmış bir herbisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **AMİD 330 EC** bitki koruma ürününün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup K1:3** haricinde) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ürünler ile karıştırılması tavsiye edilmez.



## AMİD 330 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU K1:3 HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)

330 g/l Pendimethalin

### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında ağızdan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

### RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş. MERKEZ

Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok.  
Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa / ANTALYA  
Tel: + 90 242 324 75 10-11 Faks: + 90 242 324 75 12

### ÜRETİM YERİ

BOR Karma Organize Sanayi Bölgesi  
Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km 4 Nolu Yol No: 10 Bor / NIĞDE  
Tel: +90 (388) 315 00 74-75 / Faks: +90 (388) 315 00 73



Emine CEYLAN GÜNEŞ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

10 Subat 2021

