

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve No :

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	PHI*
HIYAR (SERA)	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	100 ml/100 l su (Nimf, Ergin)	1 gün

(*) PHI: Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Gerekli bitki koruma ürünü miktarı önce bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır. Uygulama aleti yarıya kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır.

KULLANMA ŞEKLİ:

CHİNUFUR EC sera uygulamalarına uygun bir pülverizatör ile uygulanabilir. Sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde iyi bir şekilde kaplama uygulama yapınız. Yapılan kontrollerde kırmızı örümcek yoğunluğu ekonomik zarar düzeyine ulaştığında (yaprak başına 3-5 adet kırmızı örümcek) uygulamalara başlanır. Kırmızı örümceklerin direnç kazanmasını önlemek için **CHİNUFUR EC** ile farklı etki mekanizmasına sahip olan akarisitlerle dönüşümlü olarak kullanılması tavsiye edilir.

ASTRANOVA CHİNUFUR EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	6	AKARİSİT
-------	---	----------

9.3 g/l Milbemectin

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5',6',11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.1^{4,8}.0^{20,24}]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-tetrahydropyran-2-one and (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-6'-ethyl-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.1^{4,8}.0^{20,24}]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-tetrahydropyran-2-one in the ratio 3 to 7

-ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ.
-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ.
-ÇOCUKLARDAN, GIDALARDAN VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
-BİTKİ KORUMA ÜRÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
-MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK VE SİPERLİK KULLANINIZ.
-DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ. SİGARA İÇMEYİNİZ.
-İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
-BOŞ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ AMBALAJININ İÇERİSİNE(¼)BİR BÖLÜ DÖRDÜNE KADAR TEMİZ SU KOYUP İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKİNİN İÇERİSİNE BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRAR EDİLİR.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM): 114

05 Aralık 2014
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı :
Azami perakende satış fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xn: Zararlı

TEHLİKE SEMBOLÜ



Xn: Zararlı

İÇİNDEKİLER: Milbemectin

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

R 10: Alevlenir.

R 20/21: Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

R 38: Cildi tahriş edicidir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

S 1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S 16: Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.— Sigara içmeyin.

S 23: Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın

S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.

hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin).

S 36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu

gözlük/maske kullanın.

S 45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız

ASTRANOVA
TAR. TİC. VE SAN. A.Ş.
Antalya Kurumlar V. D.: 091 050 9362
Çağlayan Mh. Eski Lara Yolu 2049 Sk. Kaplan Apt.
No: 1/5 Muratpaşa / ANTALYA
M. Base

Dr. Yunus BAYRAM
Daire Başkanı

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

CHİNUFUR EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6 olarak sınıflandırılmış bir akarisitdir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CHİNUFUR EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 6 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Bordo bulamacı ve kükürt gibi kuvvetli alkali bitki koruma ürünleri haricinde insektisit ve fungisitlerle karıştırılabilir.



ASTRANOVA
CHİNUFUR EC
EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	6	AKARİSİT
-------	---	----------

9.3 g/l Milbemectin

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5',6',11,13,22-pentamethyl-3,7,19trioxatetracyclo[15.6.1.1^{4,8}.0^{20,24}]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-tetrahydropyran-2-one and (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-6'-ethyl-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.1^{4,8}.0^{20,24}]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-tetrahydropyran-2-one in the ratio 3 to 7

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Karakteristik bir zehirlenme belirtisi görülmez.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Bitki koruma ürünü yutulmuşsa doktor tarafından önerilmedikçe hastayı kusturmayınız. Hastanın bilinci yerinde değilse ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Vücuda bulaşması durumunda bulaşık giysiyi çıkarınız. Bitki koruma ürünü temas eden vücut kısımlarını 15- 20 dakika bol su ve sabunla yıkayınız. Göze sıçramışsa, gözler 15-20 dakika süre ile bol su ile yıkayınız. Aşırı solunması halinde, hastayı temiz havaya çıkarınız. Nefes alamayana suni solunum yaptırınız. Her türlü zehirlenme durumunda tıbbi yardım isteyiniz. Bitki koruma ürünü ambalaj ve etiketini doktora gösteriniz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM): 114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Tavsiye edilen bitkilerde ve tavsiye edilen dozlarda uygulandığında fitotoksik etki görülmez.

Kuşlara ve balıklara zehirlidir. Her türlü su kaynağına bulaştırmaktan kaçınınız.

Yağmurla yıkanmaya dayanıklıdır.

Kaplama uygulama yapılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA DURUMU:

Orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak, serin ve kuru normal depolama şartlarında muhafaza edildiğinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde 2 yıl süre ile hoşgörür sınırları dışında bir değişiklik olmaz. -5 °C'nin altında ve + 35 °C'nin üstünde depolamayınız.

FİRMA BEYANI:

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA

ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.

MERKEZ:

Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok.

Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa / ANTALYA

Tel: + 90 242 324 75 10-11 Faks: + 90 242 324 7512

FABRİKA:

BOR Karma Organize Sanayi Bölgesi

Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km 4 Nolu Yol No: 10 Bor / NIĞDE

Tel: +90 388 315 00 75-74 Faks: +90 388 315 00 73



ASTRANOVA
TAR. TİC. VE SAN. A.Ş.
Antalya Kurumlar V. D.: 091 050 9362
Çağlayan Mh. Eski Lara Yolu 2049 Sok. Kaplan Apt.
No: 1/5 • Muratpaşa / ANTALYA

M. Sarı

05 Aralık 2014

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



[Handwritten signature]