

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Ruhsat Tarih ve No : 07.06.2012 / 8697

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ*	Mildiyö ( <i>Plasmopara viticola</i> )	40 g/100 L su	28 gün
Patates	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	40 g/da	14 gün
Hıyar	Kabakgillerde mildiyö ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	40 g/100 L su	3 gün
Domates	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	40 g/100 L su (sera) 40 g/da (tarla)	3 gün
	Erken yaprak yanıklığı ( <i>Alternaria solani</i> )	40 g/100 L su (sera) 40 g/da (tarla)	
Karpuz (Tarla)	Alternarya yaprak yanıklığı ( <i>Alternaria cucumerina</i> )	40 g/da	3 gün

(\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaç suyu depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde ilaçlama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alanlara verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

# ASTRANOVA SPİDOLL DF

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUBU	27	C3:11	FUNGİSİT Mantar İlacı
-------	----	-------	-----------------------

%30 Cymoxanil + %22.5 Famoxadone

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
  - EVDE KULLANMAYINIZ.
  - ÇOCUKLARDAN, GIDALARDAN VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
  - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİRŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
  - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
  - İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Gastrointestinal irritasyon, yanma, diyare, baş ağrısı, halsizlik ve terleme görülebilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Soluma sonrası:** Kişiyi temiz havaya çıkarınız, solumuyor ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solumada güçlük var ise, oksijen verilmelidir. Acilen **hekim çağırınız.** **Cilt teması sonrası:** Karışım cilde temas durumunda bulaşmış giysi ve ayakkabılarınızı çıkarın, bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Cildin tahriş olması durumunda veya alerjik reaksiyonlar görüldüğü takdirde doktora başvurunuz. Giysileri tekrar kullanılmadan önce yıkayınız. **Göz teması sonrası:** Karışımın göze temas etmesi durumunda acilen bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. **Kontakt lens varsa hemen çıkarınız bol su ile en az 15 dakika yıkayınız.** **Yutma sonrası:** Yutulmuş ise, acilen **tıbbi yardım almasını** sağlayınız. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayın. Bilinç kapalı ise asla bir şey vermeyin.

#### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

17 Ocak 2018  
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

Dr. Yunus BAYRAM  
Genel Müdür Yardımcısı V.

Net Miktarı :  
Şarj No :  
Azami Perakende Satış Fiyatı :

**İÇİNDEKİLER:** Famoxadone, Cymoxanil

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ



#### DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ

- H302** Yutulması halinde zararlıdır.
- H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H361fd** Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
- H373** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ

- P202** Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
  - P264** Elleçlemeden sonra ellerinizi bol su ve sabun ile iyice yıkayın.
  - P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
  - P314** Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın.
  - P273** Çevreye verilmesinden kaçınınız.
  - P391** Döküntüleri toplayın.
  - P405** Kilit altında saklayın.
  - P501** İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.
- EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**ASTRANOVA**  
TAR. TİC. VE SAN. A.Ş.  
Antalya Kuluçla Yolu No: 901 050 9362  
Tel: 0.242 324 75 10 Faks: 0.242 324 75 12  
Çağlayan Mh. Eski Çarşı Yolu 2049 Sk. Kaplan Apt  
No: 1/5 07050 PATLARSA/ANTALYA  
Fatma KESİMCİ

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

**Bağ mildiyö:** İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

**Patates mildiyö:** Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

**Hıyar Kabakgillerde mildiyö:** İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

**Domates mildiyö:** İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

**Domates Erken yaprak yanıklığı:** Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

**Karpuz (Sera) Alternarya yaprak yanıklığı:** Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalık şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:** SPİDOLL DF adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre **Grup 27 - C3:11** olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **SPİDOLL DF** bitki koruma ürününün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 27 - C3:11** harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞILIRLIK DURUMU:** Alkali karakterli ve yağlı ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Diğer ilaçlarla karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

# ASTRANOVA SPİDOLL DF

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUBU	27	C3:11	FUNGİSİT Mantar İlacı
-------	----	-------	-----------------------

%30 Cymoxanil + %22.5 Famoxadone

## KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir amaçla kullanmayınız.
- Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- -5°C' nin altında ve +35°C' nin üstünde depolamayınız.

## DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:** Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

## RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş. MERKEZ

Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok.  
Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa / ANTALYA  
Tel: + 90 242 324 75 10-11 Faks: + 90 242 324 75 12

## ÜRETİM YERİ

Karma Organize Sanayi Bölgesi  
Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km 4 Nolu Yol No: 10 Bor / NİĞDE  
Tel: +90 (388) 315 00 74-75 Faks: +90 (388) 315 00 73



17 Ocak 2018

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

