

İmal Tarih :  
Son Kullanma Tarihi :  
Ruhsat Tarih ve No : 28.11.2014 / 9935

**GENEL BİLGİLER:** **YEKDOZ WG**, sistemik ve kontak özelliklere sahip bir fungisittir. Ürünün bileşimine giren iki etkili maddeden biri olan "**Cyprodinil**" methionin biyosentezini engeller, "**Cyprodinil**" yapraklar ve meyveden süratle bünyeye alınır. Bitkide yukarıya doğru ve yaprağın bir yüzeyinden diğer yüzeyine iyi bir şekilde taşınır. Ürünün bünyesinde bulunan diğer etkili madde "**fludioxonil**" kontak etkili olup, esas itibarıyla konidilerin çimlenmesini ve fungusit miselinin penetrasyonunu engeller.

#### KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ*	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	50 g/100 L su	7 gün
Domates	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g/100 L su	7 gün
Biber (Sera)	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g/100 L su	7 gün
Hıyar (Sera)	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g/100 L su	7 gün
Kiraz	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası ( <i>Sclerotinia laxa</i> )	40 g/100 L su	7 gün
Çilek	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g/100 L su	7 gün
Patlıcan (Sera)	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g/100 L su	7 gün

(\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde ilaçlama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız ve az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

12 Subat 2018

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

# ASTRA NOVA

## YEKDOZ WG

Suda Dağılılabilen Granül ( WG )

Grubu	D1:9	E2:12	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	------	-------	-------------------------

% 37.5 Cyprodinil + % 25 Fludioxonil

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. **İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

**Soluma sonrası:** Karışım solunmuş ise, kişi temiz havaya çıkarılmalı, solumuyor ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solumada güçlük var ise, oksijen verilmelidir. Acilen hekim çağırılarak girişimde bulunulmalıdır.

**Cilt teması sonrası:** Karışım cilde temas durumunda bulaşmış giysi ve ayakkabılarınızı çıkarınız bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır.

**Göz teması sonrası:** Karışımın göze temas etmesi durumunda acilen bol su ile en az 15 dakika yıkanmalıdır.

**Yutma sonrası:** Yutulmuş ise, acilen tıbbi yardım almasını sağlayın. Bilinç kapalı ise asla bir şey vermeyin.

**ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:** Özel bir antidötu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel:114



Net Miktarı :  
Şarj No :  
Azami perakende satış fiyatı :

**İÇİNDEKİLER:** Cyprodinil , Fludioxonil

**ZARARLILIK İŞARETLERİ**



**DİKKAT**

**ZARARLILIK İFADELERİ**

**H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
**H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ**

**P261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.  
**P272** Kirilenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayınız.  
**P273** Çevreye verilmesinden kaçınınız.  
**P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.  
**P302+P352** DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.  
**P333+P313** Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.  
**P391** Döküntüleri toplayınız.  
**P501** İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.  
**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Ürün ile temastan sakınız.
- Boş ürün ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- -5 °C'nin altında ve +35 °C'nin üstünde depolamayınız.

**ASTRA NOVA**  
TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
Antalya Kurumlar Yolu No: 405/9362  
Tel: 0.242 324 75 10 Fax: 0.242 324 75 12  
Çağlayan Mh. Eski Lapa Yolu 2049 Sk. Kaplan Apt.  
No: 1/5 ÇİĞIRATPAZARI/ANTALYA  
Fatma KESİMCİ

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ

**Bağda kurşuni küf:** 1.ilaçlamaya üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce başlanmalı, 21 gün sonra 2.ilaçlama yapılmalıdır. Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

**Domateste kurşuni küf:** Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. İlaçlamalar 10 gün arayla 2-3 uygulama yapılır.

**Biber (sera) kurşuni küf :** İlaçlamalar bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

**Hıyar (sera) kurşuni küf:** İlaçlamaya hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. 10-12 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

**Kirazda sert çekirdeklielerde çiçek monilyası:** 1.ilaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte), 2. ilaçlama: Tam çiçeklenme döneminde ( %90-100 çiçekte ) yapılır.

**Çilekte kurşuni küf:** 1. ilaçlama: ilk çiçeklerin %10'u açınca 2. ilaçlama: Çiçeklerin % 50'si açınca 3. ilaçlama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılır.

**Patlıcanda (sera) kurşuni küf :** İlaçlamaya hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır. 10-12 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

**Bitki Tahammülü:** Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında tavsiye edildiği kültür bitkileri üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi yoktur. Tereddüt halinde, hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

## DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

**YEKDOZ WG** adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre **Grup D1:9** ve **E2:12** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip Bitki Koruma Ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, **YEKDOZ WG'** nin aynı üretim sezonu içerisinde toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup D1:9** ve **E2:12** harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:** Kullanılan fungusitlerin pek çoğu ile karışabilir ancak uygulamadan önce bir karışabilirlik testi uygulanmalıdır.



# ASTRANOVA

## YEKDOZ WG

Suda Dağılılabilen Granül ( WG )

Grubu	D1:9	E2:12	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	-------	-------------------------

**% 37.5 Cyprodinil + % 25 Fludioxonil**

## DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:** Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA**  
**ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.**  
**MERKEZ**

Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok.  
Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa / ANTALYA  
TEL: + 90 242 324 75 10-11 Faks: + 90 242 324 75 12

## ÜRETİM TESİSİ

BOR Karma Organize Sanayi Bölgesi  
Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km 4 Nolu Yol No: 10 Bor / NIĞDE  
Tel: +90 (388) 315 00 74-75 / Faks: +90 (388) 315 00 73

