

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Ruhsat Tarih ve No : 24.07.2014 / 9754

#### KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates	Erken yaprak yanıklığı ( <i>Alternaria solani</i> )	50 ml / 100 L su	7 gün
Turunçgiller	Kahverengi leke ( <i>Alternaria alternata</i> f. sp. <i>citri</i> )	100 ml / 100 L su	21 gün
Buğday	Tahıl küllemesi ( <i>Erysiphe graminis</i> )	75 ml / da	35 gün
	Sarı pas ( <i>Puccinia striiformis</i> )	75 ml / da	35 gün
Bağ*	Bağ küllemesi ( <i>Erysiphe necator</i> )	40 ml / 100 L su	21 gün

(\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**Kalibrasyon:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.


**Uygulama Makinasının Temizliği:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

**Domates erken yaprak yanıklığı:** Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

13 Kasım 2017

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR



# ASTRANOVA PESTİGE 250 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	G1:3	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	------	-------------------------

250 g/l Tebuconazole

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
  - EVDE KULLANMAYINIZ.
  - ÇOCUKLARDAN, GIDALARDAN VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
  - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
  - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
  - İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ İÇERİSİNE 1/4' ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYULUP İYİCE ÇALKALAYINIZ.
  - ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Gözler yaşarabilir, kızarıklık yapabilir, korneaya zarar verebilir. Maruz kalınması halinde kızarma ile tahriş yapabilir. Solunum sistemlerinde tahrişe sebep olabilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:** **Soluma sonrası:** Karışım solunmuş ise, kişi temiz havaya çıkarılmalı, solunmuyor ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solumada güçlük var ise, oksijen verilmelidir. Acilen hekim çağırılarak girişimde bulunulmalıdır. **Cilt teması sonrası:** Karışım cilde temas durumunda bulaşmış giysi ve ayakkabılarınızı çıkarın bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Gıysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır. **Göz teması sonrası:** Karışımın göze temas etmesi durumunda acilen bol su ile en az 15 dakika su ile yıkanmalıdır. Tahriş ve kırmızılık varsa doktora başvurun. **Yutma sonrası:** Yutulmuş ise, acilen tıbbi yardım almasını sağlayın. Dilinizi kapalı ise asla bir şey vermeyin.

**ANTİDOTU VE TEDAVİ ÖNLEMLERİ:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net Miktarı :  
Şarj No :  
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER: Tebuconazole , Ksilen

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ



Uyarı kelimesi: DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- H302 Yutulması halinde zararlidir.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
- H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ

- P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
- P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.
- P264 Elleçlemeden sonra ellerinizi bol su ve sabun ile iyice yıkayın.
- P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P330 Ağzınızı çalkalayın.
- P391 Döküntüleri toplayın.
- P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**ASTRANOVA**  
TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
ANTALYA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölgesi No: 191 050 9362  
Tel: 0.242 324 75 10 Fax: 0.242 324 75 12  
Çağlayan Mh. Eski Karara Yolu 2049 Sk. Kaplan A.Ş.  
No: 1/5 MURATPAZARI/ANTALYA

Fatma KESİMCİ

**Buğdayda tahl küllemesi:** İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yapraklarının özellikle bayrak yaprağının hastalıkla buluşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

**Buğday sarı pas:** Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 10-14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

**Turunçgillerde kahverengi leke:** Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır.

Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvelerinin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklığın arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

**Bağ küllemesi:** 1.Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2.Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde, 3.Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan hemen sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

**PESTİGE 250 EC** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup G1:3** olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **PESTİGE 250 EC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup G1:3 hariç**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞILIRLIK DURUMU

**PESTİGE 250 EC**, Yüksek derecede asidik ve bazik formülasyonlu bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

# ASTRANOVA PESTİGE 250 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	G1:3	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	------	-------------------------

250 g/l Tebuconazole

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayın.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz, başka amaç için kullanmayınız.
- Direk güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- -5 °C'nin altında ve + 35 °C'nin üstünde depolamayınız.

#### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

#### RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA

**ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.**

#### MERKEZ

Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok.  
Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa / ANTALYA  
Tel: + 90 242 324 75 10-11 Faks: + 90 242 324 75 12

#### ÜRETİM YERİ

BOR Karma Organize Sanayi Bölgesi  
Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km 4 Nolu Yol No: 10 Bor / NIĞDE  
Tel: +90 (388) 315 00 74-75 / Faks: +90 (388) 315 00 73

**ASTRANOVA**  
TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.  
Antalya Kurumlar No: 095 050 9362  
Tel: 0 242 324 75 10 / Faks: 0 242 324 75 12  
Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sk. Kaplan Apt.  
No: 1/5 - MURATPAŞA/ANTALYA

Fatma KESİMCİ

13 Kasım 2017

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

