

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Ruhsat Tarih ve No :15.05.2012/8673

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU
BAG*	Külleme (<i>Erysiphe necator</i>)	400 ml/100 L su
DOMATES (Sera)	Patlicangillerde külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	400 ml/100 L su

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdaiken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

ASTRANOVA

SAUPOLO 80 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	M2	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	----	-------------------------

800 g/L Kükürt

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
 - EVDE KULLANMAYINIZ.
 - ÇOCUKLARDAN, GIDALARDAN VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
 - İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4' ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Büyük miktarlarda yutulduğunda mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, ishal ve uyku hali görülür.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma sonrası: Kazazedeyi açık havaya çıkarın. Soluk alıp verme düzenli değilse ya da durmuşsa suni solunum uygulayın. Kazazedeyi sıcak ve rahat bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.

Cilt teması sonrası: Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yeri bol su ile yıkayın. Eğer ciltte tahriş ve kızarıklık varsa doktora danışın. Giysileri kullanmadan önce yıkayın.

Göz teması sonrası: Karışımın göze temas etmesi durumunda acilen bol su ile en az 15 dakika yıkanmalıdır. Gözde kontak lens varsa çıkarın, durulamaya devam edin. Tahriş ve kızarıklık varsa doktora danışın.

Yutma sonrası: Ağız çalkalayın. Kusturmayınız. Bilinç kapalı ise asla bir şey vermeyin. Acilen doktora veya zehir merkezine danışın. Ürün etiketini yanınızda götürünüz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Net Miktarı :
Şarj No :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER: Kükürt

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H315 Cilt tahrişine yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ


- P264 Elleçlemeden sonra ellerinizi bol su ve sabun ile iyice yıkayın.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.
- P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ASTRANOVA
TARIM ÜRÜNLERİ SAN. A.Ş.
Antalya Kurumlar Yolu No: 051 050 9362
Tel: 0 242 324 75 12 Faks: 0 242 324 75 12
Çağlayan Mh. Esenlerara Yolu 2049 Sk. Kaplan Apt
No: 115 • BURATPAŞA/AANTALYA

AN

29 Kasım 2017

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağda külleme:

- 1.İlaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
 - 2.İlaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde
 - 3.İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
 4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.
- Domates (sera) Patlıcangillerde külleme:** İlaçlamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. İklim şartlarının hastalık için uygun gitmesi halinde uygulamaya 10-12 gün aralıklarla devam edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

SAUPOLO 80 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup M2** olarak sınıflandırılmış bir fungisitdir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **SAUPOLO 80 SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup M2** harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Yağ ve yağ içeren bitki koruma ürünü haricinde birçok bitki koruma ürünü ile karıştırılabilir. Ancak karıştırılmadan önce karışım testi yapılması tavsiye edilir.



SAUPOLO 80 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	M2	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	----	-------------------------

800 g/L Kükürt

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Boş ürün ambalajlarını başka hiçbir gaye için kullanmayınız.
- Boşalan goda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- -5 °C 'nin altında ve +35 °C 'nin üstünde depolamayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA

ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.

MERKEZ

Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok.

Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa / ANTALYA

Tel: + 90 242 324 75 10-11 Faks: + 90 242 324 75 12

ÜRETİM YERİ

BOR Karma Organize Sanayi Bölgesi

Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km 4 Nolu Yol No: 10 Bor / NIĞDE

Tel: +90 (388) 315 00 74-75 / Faks: +90 (388) 315 00 73



A N

29 Kasım 2017

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı