

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve No :

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
Sog'an	Horoz ibiği (<i>Amaranthus spp.</i>) Sirkon (<i>Chenopodium album</i>) Çoban değneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Halklı Şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Adana pancarı (<i>Beta adanensis</i>) Çatal otu (<i>Digitalia sanguinalis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Fare kulüğü (<i>Anagallis arvensis</i>) Çoban çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Yabani semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Yapışkan otu (<i>Setaria verticillata</i>) Yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Tıllı kuyruklu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	300 ml/da Ekimden hemen sonra gıks örcesi
Pamuk	Sütleğen (<i>Euphorbia prostrata</i>) Yeşil horoz ibiği (<i>Amaranthus viridis</i>) Yabani jüt (<i>Cochorus olitorius</i>) Çatal otu (<i>Digitalia sanguinalis</i>) Y. Semiz otu (<i>Portulaca oleracea</i>) Kırpıdan (<i>Setaria verticillata</i>) Sirkonşür (<i>Chenopodium album</i>) Kırmızı köklü kuyruklu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Darıcan (<i>Datura stramonium</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Köpek üzünü (<i>Solanum nigum</i>) Baneli darıcan (<i>Echinochloa colorum</i>)	300 ml/da Ekim öncesi

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçların makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaki karışım depoya ilave edilir. Karışımaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karışımın işlenine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktar 20-40 litre cinsli. Uygulamalarda yelpaze huarelli meme kullanılmaktadır. Hazırlanan karışım ayrı gün içinde kullanılmalıdır. **KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir sonuç sağlanacak şekilde delizi alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün erken saatlerinde, rüzgarız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. **İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltın. Depoya temiz su doldurduktan sonra karışımın ve plaskürten sistemini çalıştırarak tüm parçaları yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

06 Nisan 2021

SHACKAST 450 CS

Kapsül Süspansiyon (CS)

GRUBU K1 HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)

450 g/l Pendimethalin

- Önce etiketi okuyunuz.
 - Eyde kullanmayınız.
 - Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 - Çoçuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 - Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 - Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 - İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞİNDE KULLANILMAMIŞTIR**
- KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemleri 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Gözlerde ve deride tahriş, kan hücümü, ateş yapar.

İLAK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma sonrası: Karışım solummuş ise, kişi temiz havaya çıkarılmalı, solunuyor ise sürü teneffüs yaptırılmalıdır. Solumada güçlük var ise, oksijen verilmalıdır. Acilen hekim çağırılarak girişimde bulunulmalıdır.

Cilt teması sonrası: Karışım cilde temas durumunda buluşmuş giysi ve ayakkabılarınızı çıkarın, bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Giysiler tekker kullanılmadan önce yıkanmalıdır.

Göz teması sonrası: Karışımın göze temas etmesi durumunda acilen bol su ile en az 15 dakika yıkamalıdır.

Yutma sonrası: Yutulmuş ise, acilen tıbbi yardım alınmasını sağlayın. Biling kapseli ise asla bir şey vermeyin.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net Miktar :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER: Pendimethalin

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H410 Sıcul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

- P264 Elleylemeden sonra ellerinizi bol su ve sabun ile iyice yıkayın.
- P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşını söz konusu ise: Tıbbi yardım/mudahaale alın.
- P391 Döküntüleri toplayın.
- P501 İçerdiği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulamaya ille ilgili önerileri mutlaka okuyunuz.
- Uygulamadan sonra makineyi temizleyiniz.
- Torbun yatağı iyi hazırlanmalı, toprak ince ve kesselsiz olmalıdır.
- Tavsiye edilen ekim derinliklerine tıbbiyle uyulmalıdır.
- **SHACKAST 450 CS** ürününden en iyi sonucu alabilmek için toprak rutubetli gartır.
- %10'dan fazla organik madde içeren topraklarda ot kontrolünde azalma olabilir. Kumlu topraklarda kullanılmamalıdır.
- Uygulama düzün yapılmamışsa yabancıot kontrolünü azaltır veya bitkiye zarar verir.
- Bölgeler ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Su güllenlen yerlerde kullanılmamalıdır.
- Bitkilere zararlıdır, yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına buluşturmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanılmayınız.
- -5 °C'nin altında ve +35 °C'nin üstünde depolanmayınız.

Antalya Kurumlar Yolu No: 1058 5962
Tel: 0 242 324 7510 / 0 242 332 73 72
Mavi 2049 SK. Şişhan Apt
Göğbeyan Mh. Eski İlçe Müdürlüğü Yanında
No: 115 MÜHÜRATPASA/ANTALYA

Fatma KESİMCİ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Sovgan: SHACKAST 450 CS, yıl hazırlanmış keseklerden, yabancılardan ve daha önce ekilmiş bitkilerin artıklarından temizlenmiş olan toprağa, soğan ekiminden sonra çikis öncesi uygulanır.
Pamuk: SHACKAST 450 CS, ekim öncesinde tarla pülverizatörüyle uygulanır. Uygulamadan sonra hemem veya en geç 4 gün içinde disk, rotoiller veya traktor ile toprağa 5-8 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karışmaya gerek yoktur.

Kurak şartlarda SHACKAST 450 CS uygulamasını takip eden 3-7 gün içerisinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

Mühavabe Bitkileri:

Hemen ekilebilecek bitkiler: Pamuk, fasulye, bezelye, soya fasulyesi, yer fısıdı, aygıçgeşi ve şağırlian bitkiler, 6 ay sonra diğer bitkiler ekilebilir.

Uygulama yapılıms tarlanı herhangi bir nedenle bozulması halinde:

Toprak 15 cm işlenerek: Budday, arpa, pamuk, patates, fasulye, soya ve bezelye.

Toprak işlenmeden: Mısır, fasulye ve bezelye ekilebilir.

Fitokoteste: SHACKAST 450 CS hasstalık, kuraklık, aşın rutubet, derin ekim, topraktaki pH oranının yüksek veya düşük olması, yüksek tuz oranı gibi nedenlerden zayıf ve stresli durumda olan bitkilerde fitokoteste yapılabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

SHACKAST 450 CS adı bitki koruma ürünü ekli mekanizmasına göre Grup K1 olarak sınıflandırılmış bir herbisitir. Aynı ekli mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **SHACKAST 450 CS** bitki koruma ürününün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı ekli mekanizmasına sahip (Grup K1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARISILIRLIK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.



SHACKAST 450 CS

Kapsül Süspansiyon (CS)

GRUBU K1 HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)

450 g/l Pendimethalin

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde herhangi (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekli, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarda ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA

ÜRETİCİ FİRMA:

Shandong Sino-Agri United Biotechnology Co., Ltd
No.28 Sangyuan Road, Jinan City, Shandong 250100, Çin
ÜRETİM TESİSİ:

Weifang Sino-Agri Union Chemical Co., Ltd.
Shandong, Çin

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.

Adres:Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok.

Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa / Antalya

Tel 1: +90 (242) 324 75 10-11

Tel 2: +90 (388) 315 00 74-75 Faks: +90 (388) 315 00 73

ASTRANOVA
TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
Antalya Kurumlar Sicil No: 270900/0362
Tel: 0 242 324 75 10-11 Faks: 0 242 324 75 12
Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok. Kaplan Apt.
No: 1/5 MURATPAŞA/ANTALYA

Satma KESİMCİ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

0 6 Nisan 2021

