

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Ruhsat Tarih ve No : 20.02.2017 / 10798

ÜRÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİLER

Bitki Adı	Bitki Çeşidi	Uygulama Amacı ve Dönemi	Uygulama Dozu (100 l su)
Elma	Kırmızı çeşitler (Starking vs.)	İri ve standart meyve için; Çiçeklenmenin % 60-80'i tamamlandığında tek uygulama	60-100 ml
	Sarı çeşitler (Golden delicious vs.)	Paslanmaya karşı; 1. uygulama tam çiçekte 2. uygulama petal (çiçek) yaprak dökünce 3. uygulama 2. uygulamadan 10 gün sonra	70 ml 70 ml 70 ml
	Sarı çeşitler (Golden delicious vs.)	İri, standart ve ince kabuk meyve için; 1. uygulama taç yapraklar dökülmeye başlayınca 2. uygulama 1. uygulamadan 7 gün sonra 3. uygulama 2. uygulamadan 10 gün sonra	60-100 ml 60-100 ml 60-100 ml
	Genç fidanlarda (Bütün çeşitler)	Ağaçların gelişmesi, meyve dallarının büyümelerinin teşvik edilmesi ve ağaçların meyve veriminin çabuklaştırılması için, 1-2-3 yaşındaki ağaçlara erken ilkbaharda bir uygulama yapılır.	200 ml
Armut	Williams ve diğer çeşitler	İri standart şekil ve büyüklükte meyve için; 1. uygulama taç yapraklar dökülmeye başladığında 2. uygulama 1. uygulamadan 7-10 gün sonra	60 ml 60 ml

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ürün önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakten karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

ASTRANUR elma ve armut ağaçlarında kullanılan bir üründür. Tavsiye edilen zaman ve dozlarda, sağlıklı ve bakımlı ağaçlarda uygun hava koşullarında aşağıda belirtilen sonuçlar elde edilir:

- Tüm elma, armut çeşitlerinde meyveler irileşir, ağırlık kazanır, standart boy ve şekilde meyveler oluşur, daha fazla verim elde edilir.
- Daha çok meyve dalı oluşur, ağaçlarda şekil güzelleşir, meyve gözleri artar, daha fazla meyve elde edilir.
- Meyve tutumunu düzenler, meyve ağırlığını artırır, büyük ve iri görünüşlü meyve oluşmasını sağlar.

KARIŞIBİLİRLİK DURUMU

Diğer ürünlerle karıştırılması tavsiye edilmez.



Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu - Bitki Gelişim Düzenleyici

**18,8 g/l 6-Benzyladenine +
18,5 g/l Gibberellin A4/A7**

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDALARDAN VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- ÜRÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜN UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajının içerisine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Soluma sonrası: Karışım solunmuş ise, kişi temiz havaya çıkarılmalı, solumuyor ise suni teneffüs çıkarılmalıdır. Solumada güçlük var ise, oksijen verilmelidir. Acilen hekim çağırılarak girişimde bulunulmalıdır.

Cilt teması sonrası: Karışım cilde temas durumunda bulaşmış giysi ve ayakkabılarınızı çıkarın bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Derinin tahriş olması durumunda veya alerjik reaksiyonlar görüldüğü takdirde doktora başvurunuz. Giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır.

Göz teması sonrası: Kontak lensler varsa çıkarılması kolaysa çıkarın. Karışımın göze temas etmesi durumunda acilen bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Göz tahrişi devam ederse bir doktora başvurun.

Yutma sonrası: Yutulmuş ise, acilen tıbbi yardım almasını sağlayın. Kusturmayınız. Bilinç kapalı ise asla bir şey vermeyin. Bilinci açık ise ağzı su ile çalkalayınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL:114

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA GÜVENLÜĞÜ VE BESLENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

15 Şubat 2018

Net Miktarı :
Şarj No :
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER: Gibberellin A4/A7, 6-Benzyladenine

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

- H302** Yutulması halinde zararlıdır.
- H315** Cilt tahrişine yol açar.
- H318** Ciddi göz hasarına yol açar.
- H335** Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
- H336** Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

- P261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.
- P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.
- P312** Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimini arayınız.
- P403+P233** İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabi sıkıca kapalı tutunuz.
- P405** Kilit altında saklayınız.
- P501** İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.
- EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Anırlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boş kapları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına ürünü koymayınız.
- Tavsiyelere uygun dozda fitotoksik değildir.
- Uygulamadan sonra 6 saat içerisinde yağmur yağması durumunda ürünün etkisi azalabilir.
- En iyi etki için uygulama suyunun pH'sı 5-7 arası olmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA

ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.

MERKEZ: Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok.

Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa / ANTALYA

Tel: + 90 242 324 75 10-11 Faks: + 90 242 324 75 12

ÜRETİM YERİ: BOR Karma Organize Sanayi Bölgesi

Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km 4 Nolu Yol No: 10 Bor / NIĞDE

Tel: +90 (388) 315 00 74-75 / Faks: +90 (388) 315 00 73

