

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve No : 21.10.2010 / 8034

GENEL BİLGİLER: SUDOOR 400 SC, bir "böcek büyüme düzenleyicisi" (IGR) insektisit olup, temas ve mide yoluyla etkilidir. SUDOOR 400 SC, güçlü bir larva öldürücü (larvasit) etkiye sahiptir. Nimf ve larvaların deri değişikliğini yavaşlatarak ölümlerine sebep olur. Kiti sentezi yapamayan larvalar gömlek değiştiremezler ve ölürlür. Ayrıca bitki koruma ürününe maruz kalan erginlerin yumurta bırakma oranları azalır. Bitki koruma ürünü bu özellikleriyle entegre mücadele programlarına uygunluk arz eder.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 ml/da Larva, pupa	-
Turuncgiller*	Turuncgill san kabuklubiti (<i>Aonidiella citrina</i>)	65 ml/100 l su, nimf	56 gün
	Turuncgill kırmızı kabuklubiti (<i>Aonidiella aurantii</i>)	65 ml/100 l su, nimf	
	Turuncgill beyazsineği (<i>Dialeurodes citri</i>)	35 ml/100 l su	
Nar	Nar beyazsineği (<i>Siphoninus phillyreae</i>)	35 ml/100 l su (Yumurta, larva, pupa)	56 gün

*Turuncgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız ve az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta Tütün beyazsineğine karşı: beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Turuncgillerde Kabuklubit mücadelesi: İlaçlamaya karar vermek için yapılan yaprak kontrollerinde, *Aonidiella citrina* için yaprak başına düşen canlı ergin ve nimf 20'den, *Aonidiella aurantii* için 50'den fazla ise, her iki zararlı için yapılan meyve kontrollerinde (meyveler fındık büyüklüğünde) ise %15 meyve bulaşıklığı saptanırsa ilaçlama yapılmalıdır. Uygulama gereken bahçelerde bu zararlılara karşı kışın (hasattan hemen sonra başlanıp, Şubat sonuna kadar olan dönemde) ve yazın ilk hareketli nimf görüldükten 2 hafta sonra olmak üzere 2 ayrı zamanda uygulama yapılabilir. Popülasyonun durumuna göre uygulamalara kontrollü olarak devam edilebilir. Uygulamalardan daha iyi sonuç alabilmek için uygulamaya ağacın iç tarafından başlanılmalı, daha sonra ağaçların tac çevresi dolaşarak ağaç alttan üste iyice ilaçlanmalıdır.

ASTRANOVA
SUDOOR 400 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	16	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
-------	----	--------------------------

400 g/l Buprofezin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıdalardan ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbirşey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının içine 1/4' üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma sonrası: Karışım solunmuş ise, kişi temiz havaya çıkarılmalı, solumuyor ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solumada güçlük var ise, oksijen verilmelidir. Acilen hekim çağırılarak girişimde bulunulmalıdır.

Cilt teması sonrası: Karışım cilde temas durumunda bulaşmış glysi ve ayakkabılarınızı çıkarın bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır.

Göz teması sonrası: Karışımın göze temas etmesi durumunda acilen bol su ile en az 15 dakika yıkanmalıdır.

Yutma sonrası: Yutulmuş ise, acilen tıbbi yardım almasını sağlayın. Bilinç kapalı ise asla bir şey vermeyin.

ANTİDODU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidodu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanması tavsiye edilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

N. Arıcan
Dr. Naci AKIR-ARİCAN
Bölge Başkanı

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER: Buprofezin

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):
H302 Yutulması halinde zararlıdır.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P264 Elleylemeden sonra ellerinizi bol su ve sabun ile iyice yıkayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
P330 Ağızınızı çalkalayın.
P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Boş ürün ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız, usulüne uygun imha ediniz.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- -5 °C 'nin altında ve +35 °C 'nin üstünde depolamayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

ASTRANOVA
TAR. ÜC. İS. AN. A.Ş.
Antalya Kurum Y. D. 09 050 9362
Tel: 0.242 324 14 14 Fax: 0.242 324 75 12
Çağlayan Mh. Eski Yolu 2049 Sk. Kaplan Apt.
No: 1/5 KATPAŞA/ANTALYA

Fatma KESİMCİ

7 09 Mayıs 2022
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Turuncgil beyazsineğine karşı yapılan sayımlarda yaprak başına en az 3 adet canlı birey (yumurta, nimf ve pupa) bulunuyorsa kimyasal mücadele yapılır. Doğada ilk kez 3. dönem nimfler görüldüğünde 1. ilaçlama yapılır. Bu dönem Haziran ayının ilk yarısına denk gelmektedir. Gerekirse ikinci ilaçlama, 2. dölle karşı Ağustos ayı ikinci yarısından itibaren yapılır. İlaçlama tekniğe uygun şekilde yapıldığı takdirde tek uygulama yeterlidir. Uygulamada özellikle yeni sürmüş genç yaprakların alt yüzeylerinin ıslatılmasına özen gösterilmelidir.

Narda Nar beyazsineğine karşı uygulama zamanını tespit amacıyla ilkbaharda mayıs ayı itibarı ile etek dallardaki yaprakların alt yüzeyleri kontrol edilerek sayımlar yapılır. Yumurta, larva ve pupa sayılarının toplamı yaprak başına 10 ve üzeri ise uygulamaya karar verilir.

Bitki Tahammülü: Tavsiye edilen kültür bitkilerinde, tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında herhangi bir fitotoksiste yapmaz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

SUDOOR 400 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup 16** olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **SUDOOR 400 SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 16 harici**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

SUDOOR 400 SC'nin diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.



SUDOOR 400 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	16	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
-------	----	--------------------------

400 g/l Buprofezin

FİRMA BEYANI:

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlara ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.

MERKEZ:

Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok.
Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa/ANTALYA
Tel: + 90 242 324 75 10-11 Faks: + 90 242 324 75 12

ÜRETİM TESİSİ:

BOR Karma Organize Sanayi Bölgesi
Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km 4 Nolu Yol No: 10 Bor/NİĞDE
Tel: +90 388 315 00 75 Faks: +90 388 315 00 73



09 Mayıs 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.