

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve No :

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Kiraz*	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	20 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf, ergin)	14 gün
Şeftali	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	20 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf, ergin)	21 gün

*Kirazda ilaçlamalar meyvesiz ağaçlarda veya hasattan sonra yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız ve az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Kiraz, Şeftali İkinoktalı Kırmızıörümceğe karşı, Mayıs ayından itibaren, 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda, ikinoktalı kırmızıörümcek sayısının yaprak başına ortalama 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda ilaçlama yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ESMURY® SC 240 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup 23;6** olarak sınıflandırılmış bir akaristtir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, **ESMURY® SC 240'** ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 23;6 hariç**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Alkali özellikteki bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Eğer bir karışıma ihtiyaç duyulursa, önce ayrı bir kapta ön karışım testi yapılmalıdır. Karışımlar bekletilmeden kullanılmalıdır.


Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Sayfa 1/1



ESMURY® SC 240

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	23;6	AKARİST (Kırmızıörümcek İlacı)
-------	------	--------------------------------

222 g/l Spirodiclofen + 18 g/l Abamectin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının içerisine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma sonrası: Karışım solumuş ise, kişi temiz havaya çıkarılmalı, solumuyor ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solumada güçlük var ise, oksijen verilmelidir. Acilen hekim çağırılarak girişimde bulunulmalıdır.

Cilt teması sonrası: Karışım cilde temas durumunda bulaşmış giysi ve ayakkabılarınızı çıkarınız bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Giysileri tekrar kullanılmadan önce yıkayın.

Göz teması sonrası: Karışımın göze temas etmesi durumunda acilen bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Tahris varsa doktora danışın.

Yutma sonrası: Yutulmuş ise, acilen tıbbi yardım almasını sağlayınız. Bilinç kapalı ise asla bir şey vermeyiniz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

24 Ocak 2024

* ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktar :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

Ek-1

İÇİNDEKİLER: Spirodiclofen, Abamectin

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H315 Cilt tahrişine yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.
P264 Elleçlemeden sonra ellerinizi bol su ve sabun ile iyice yıkayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P332+P313 Ciltte tahris söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçınınız.
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yer üstü ve yer altı sularına bulaştırmayınız.
- Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajında ağız kapalı olarak saklayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Boş ilaç ambalajları usulüne uygun imha ediniz.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:

ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.

MERKEZ:

Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok.
Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa/ANTALYA
Tel: +90 242 324 7510-11 Faks: +90 242 324 7512
No: 1/5 MURATPAŞA/ANTALYA

ÜRETİM YERİ:

BOR Karma Organize Sanayi Bölgesi
Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km 4 Nolu Yol No: 10 Bor/NİĞDE
Tel: +90 388 315 0074-75 Faks: +90 388 315 0073


ASTRANOVA
TAR. TİC. VE SAN. A.Ş.
Antalya, Kuluçka Y. O.: 091 050 9362
Tel: 0.242 324 7510 • Faks: 0.242 324 75 12
Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok. Kaplan Apt.
No: 1/5 MURATPAŞA/ANTALYA
Fatma ERSÖZ