

Zeytinde Zeytin pamuklukoşniline karşı: Zararlı görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Zeytinde Zeytin kabuklubitine karşı: Yumurtalı dişiler kontrol edilerek ve yumurtaların %50'sinin açıldığı (ikinci döl erginlerinin %70-80'i bulduğu) zaman uygulama yapılmalıdır.

Zeytinde Zeytin karakoşniline karşı: Yumurtaların %50'sinin açıldığı devrede birinci, %90'ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Zeytinde Zeytin yarakoşniline karşı: Zararlı görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Turuncgillerde Turuncgil pasböcüsüne karşı: Mayıs ayı başından itibaren 7-8 günde bir bahçenin değişik yerlerinde el lupu ile 100 meyvede yapılan kontrollerde bir görüş alanında (1 cm²) 1-2 adet pasböcüsü görüldüğünde uygulamaya başlanır.

Turuncgillerde Turuncgil unlubitine karşı: Meyveler fındık iriliğinde iken, %10 ve daha fazla canlı bulaşıklığı saptanan bahçelerde biyolojik mücadele uygulamasından önce, popülasyonu düşürmek ve dökümü kısmen önlemek için yazlık yağ uygulaması yapılır.

Turuncgillerde Turuncgil kırmızı kabuklubitine karşı: Uygulamaya karar vermek için turuncgil sarı kabuklubiti için yaprak başına düşen canlı ergin ve nimf 20'den, turuncgil kırmızı kabuklubiti için 0,5'den fazlaysa, her iki zararlı için yapılan meyve kontrollerinde (meyveler fındık büyüklüğünde) ise %15 meyve bulaşıklığı (bir kabuklubit bulunsa bile meyve bulaşık kabul edilir) saptanırsa uygulama için yeterli yoğunluk olduğu kabul edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

AFORS® 700 isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre **Grup UN** olarak sınıflandırılmış bir insektisit - akarisit. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **AFORS® 700**'ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup UN** harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

DİRENCİ, Bitki Koruma Ürünleri ile karıştırılmaz.



GRUBU	UN	İNSEKTİSİT- AKARİSİT (Böcek - Kırmızıörümcek İlacı)
-------	----	---

700 g/l Mineral Yağ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

13 Kasım 2024

Is 34



Ek

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda normalde depolandığında 2 yıl süre ile ilacın rızıkseti, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanlama uygulamasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.

MERKEZ: Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok.
Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa / ANTALYA
Tel: +90 242 324 75 10-11 Faks: +90 242 324 75 12

ÜRETİM TESİSİ: BOR Karma Organize Sanayi Bölgesi
Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km 4 Nolu Yol No: 10 Bor / NİĞDE
Tel: +90 388 315 00 74-75 / Faks: +90 388 315 00 73

© ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

