

Genel Bilgiler: POTEĞON 20 SP sistemik etkilidir. Uygulamadan kısa bir süre sonra bitki bünyesine geçer ve etkisini 14 ila 21 gün korur. Aynı üretim periyodunda 2 den fazla uygulama yapılmamalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	40 g/da Nimf, pupa, ergin	-
	Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	10 g/da Nimf, ergin	
	Yaprakpireleri (<i>Imposca spp.</i>)	10 g/da Nimf, ergin	
Patates	Patates böceği (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	6 g/da Larva, ergin	7 gün
Domates (Tarla)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	30 g/100 l su Larva, ergin	3 gün
Domates (Sera)	Sera beyazsineği (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)		
Antepfıstığı	Antepfıstığı yaprakşillidi (<i>Agonosca pisidae</i>)	20 g/100 l su Ergin, nimf	7 gün
Elma	Elma yeşil yaprakbiti (<i>Aphis pomi</i>)	20 g/100 L su Ergin, nimf	14 gün
Karpuz	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	25 g/da Ergin, nimf	7 gün
Biber (Sera)	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	25 g/100 l su Ergin, nimf	3 gün
	Sera beyazsineği (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	30 g/ 100 l su Larva, ergin	3 gün
Hiyar (Örtüaltı)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	30 g/ 100 l su Larva, ergin	3 gün
	Sera beyazsineği (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)		
Kornişon (Örtüaltı)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	30 g/ 100 l su Larva, ergin	3 gün
	Sera beyazsineği (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)		
Tütün	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	10 g/da Nimf, ergin	10 gün
Patlıcan (Sera)	Sera beyazsineği (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	30 g/100 l su Larva, ergin	1 gün
	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)		
Bağ*	Turuncgöl unlu bitti (<i>Planococcus citri</i>)	50 g/100 l su	14 gün
Şeftali	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	25 g/100 l su (Nimf, ergin)	14 gün
Nar	Nar beyazsineği (<i>Siphoninus phillyreae</i>)	20 g/100 L su (Larva)	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız ve az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

f.j.
Sayfa 1/2

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

2:1-03-2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İLAÇ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



POTEĞON® 20 SP

Suda Çözünen Toz (SP)

GRUBU	4A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
-------	----	--------------------------

% 20 Acetamiprid

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıdalardan ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Hareketlerde yavaşlık, adale kasılmaları, denge bozukluğu, solunum azalışı, gözyaşı, sümük artışı.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma sonrası: Karışım solunmuş ise, kişi temiz havaya çıkarılmalı, solumuyor ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solumada güçlük var ise, oksijen verilmelidir. Acilen hekim çağınırlarak girişimde bulunulmalıdır.

Cilt teması sonrası: Karışım cilde temas durumunda bulmuş giysi ve ayakkabıları çıkarıldıktan sonra bol su ile en az 15 dakika yıkanmalıdır. Giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır.

Göz teması sonrası: Karışımın göze temas etmesi durumunda acilen bol su ile en az 15 dakika yıkanmalıdır.

Yutma sonrası: Yutulmuş ise, acilen tıbbi yardım alınması sağlanmalıdır. Bilinç kapalı ise asla bir şey vermemiz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidot yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

© ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

Net Miktarı :
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER: Acetamiprid

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçınınız.
P264 Elleçlemeden sonra ellerinizi bol su ve sabun ile iyice yıkayınız.
P280 Korumalı eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız.
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayınız.
P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P337+P313 Göz tahriş kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Su kaynaklarına, göllere, akarsulara bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Uygulamalar sabah çığ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Uygulama yapıldıktan sonra 6 saat içerisinde yağmur yağarsa uygulama tekrarlanmalıdır.
- Tavsiye dozunda fitotoksik değildir.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka bir amaçla kullanmayınız.
- -5°C' nin altında ve +35°C' nin üstünde depolamayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

ASTRANOVA
TAR. TİC. VE SAN. A.Ş.
Antalya Kurumlar V. D.: 091 050 9362
Tel: 0.242 324 75 10 • Fax: 0.242 324 75 12
Çağlayan Mh. Esat Paşa Yolu 2049 Sk. Kaplan A
No: 15 • BURSA/ANTALYA

Fatma ERSÖZ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukda Tütün beyazsineği: Beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda uygulamaya başlanmalıdır.

Pamuda Pamuk Yaprakbitti: Fide döneminde seyreltmeden sonra % 50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbitti saptandığında uygulamaya başlanmalıdır.

Pamukda Yaprakpireleri: Sürveylerde 50 da'lık bir pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpilesi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Patatesde Patates böceği: Tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, zararlıların yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döl karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (4.dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döl karşı uygulama yapılması durumunda ise yumurta ağlarının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebileceğinden, uygulama gerekmez.

Domates (tarla-sera), Biber (sera), Hıyar (örtüaltı), Kornişon (örtüaltı), Patlıcan (sera)'da Tütün beyazsineği ve Sera beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda uygulamaya başlanmalıdır.

Antepfıstığında Antepfıstığı psilidi: Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Elmada Elma yeşil yaprakbitti: Vejetasyon süresince 100 sürgünden 15'inde bulaşıklık olursa uygulama yapılmalıdır.

Karpuz, Biber (sera)'de Şeftali yaprakbitti: Uygulama zamanını tespit etmek amacıyla Nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. 20-40 yaprakta lupla yapılan sayımlarda yaprak başına ortalama 10-20 adet ise uygulamaya başlanır. Bununla birlikte parazitoid ve predatör varlığı gözlenerek uygulamaya karar vermeden önce faydalıların etkinliklerine bakılmalıdır.

Tütünde Şeftali yaprakbitti: Bir yaprakta ortalama 25 adet nimf+ergin görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir. Fide döneminde zararlı görülünce uygulama yapılır.

Bağda Turuncgöl unlubitti: Mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem, asmanın gövdesinde kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubitt'in yeşil aksamına doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönemde koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız unlubitt'in görüldüğü asmalara uygulama yapılmalıdır. İkinci devre unlubitt'in yaprak ve salımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı devredir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de uygulama yapılabilir.

Şeftalide şeftali yaprakbitti: Çiçek tomurcuklarının belirmesinden, popülasyonun 3/4'ü kanatlı forma dönüşümüne değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlanıldığında uygulama yapılmalıdır.

Narda Nar beyazsineği: Uygulama zamanının tespiti amacıyla, ilkbaharda mayıs ayı başı itibarı ile etek dallardaki yaprakların alt yüzeyleri kontrol edilerek sayımlar yapılır. Yumurta, larva ve pupa sayılarının toplamı yaprak başına 10 ve üzeri ise uygulamaya karar verilir. Nar beyazsineğine karşı nar bahçelerinde uygulama için gerekli olan yoğunluğa Akdeniz Bölgesinde genel olarak mayıs ayının ikinci yarısında ulaşmaktadır. Fakat bu dönemde nar bitkisi tam çiçeklenme döneminde olduğu için uygulamalar haziran ayının ilk yarısı gibi yapılmalıdır. Bu dönemde yapılacak tek uygulama zararlı ile mücadelede yeterlidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: POTEĞON 20 SP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için POTEĞON® 20 SP'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4A hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



POTEĞON® 20 SP

Suda Çözünen Toz (SP)

GRUBU	4A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	----	--------------------------

% 20 Acetamiprid

FİRMA BEYANI:

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış kullanılması veya depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından, uyulabilecek zararlardan ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.

MERKEZ: Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok.

Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa / ANTALYA

Tel: + 90 242 324 75 10-11 Faks: + 90 242 324 75 12

ÜRETİM TESİSİ: BOR Karma Organize Sanayi Bölgesi

Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km 4 Nolu Yol No: 10 Bor / NİĞDE

Tel: +90 388 315 00 74-75 Faks: +90 388 315 00 73



211-03-2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

