

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve No : 20.01.2015 / 10046

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	100 ml/da (Yumurta, larva, nimf)	
	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 ml/da (Larva, nimf)	
Patlıcan	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	1 gün
Elma	Avrupa kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	50 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	7 gün
Bağ *	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	7 gün
Domates (Sera)	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	100 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	3 gün
Karpuz	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	125 ml/da (Yumurta, larva, nimf)	3 gün

(*)Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.



Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU	10 A	AKARİSİT (Kırmızıörümcek İlacı)
-------	------	---------------------------------

50 g/l Hexythiazox

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıdalardan ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbirşey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının içerisine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma sonrası: Karışım solunmuş ise, kişi temiz havaya çıkarılmalı, solumuyor ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solumada güçlük var ise, oksijen verilmelidir. Acilen hekim çağırılarak girişimde bulunulmalıdır.

Cilt teması sonrası: Karışım cilde temas durumunda bulaşmış giysi ve ayakkabılarınızı çıkarın bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır.


Göz teması sonrası: Karışımın göze temas etmesi durumunda acilen bol su ile en az 15 dakika yıkanmalıdır.

Yutma sonrası: Yutulmuş ise, acilen tıbbi yardım alınması sağlayın. Bilinç kapalı ise asla bir şey vermayınız.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

08-11-2022
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Net Miktarı :
Azami perakende satış fiyatı :

İÇNDEKİLER: Hexythiazox

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
P264 Elleçlemeden sonra ellerinizi bol su ve sabun ile iyice yıkayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Taklı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Temas ve mide yoluyla etkilidir.
- Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- Bitki koruma ürünü serin, kuru ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
- Bitki koruma ürünü ambalajında, kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boş bitki koruma ürün ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- -5 °C 'nin altında ve +35 °C 'nin üstünde depolamayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.

ASTRANOVA TAR. TİC. VE SAN. A.Ş.
Antalya Şubeleri Y.D.: 094-050 9362
Tel: 0242 324 75 10-17 Faks: 0242 324 75 12
Çağlayan Mah. Esik Dura Yolu 2049 Sk.
Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa/ANTALYA

Emine CEYLAN GÜNEŞ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Pamuk kırmızıörümceği: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulama yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz bölgesinde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise 10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılır.

Bağ İki noktalı kırmızıörümcek: Yapılan sayımlarda 5-8 adet canlı birey/yaprak olduğunda uygulama yapılır.

Elma Avrupa kırmızıörümceği: Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta yapılan sayımlarda 8-10 adet canlı birey/yaprak olduğunda uygulama yapılır.

Patlıcan - Karpuz İki noktalı kırmızıörümcek: Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğu müdahaleye karar verilir.

Domates (Sera) İki noktalı kırmızıörümcek: Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğu müdahaleye karar verilir.

Meyve ağaçlarında genellikle çiçek taç yapraklarının tamamen dökülmesinden sonra birinci uygulama yapılması tavsiye edilir.

Erginlerde etkisi düşük olduğundan ergin popülasyonu çoğalmadan uygulanmaya başlanmalıdır. Eğer ergin popülasyonu fazla ise erginlere etkili bir kontakt akarisit ile kanştırılarak uygulanması tavsiye edilir.

CONCİD 5 EC doğrudan yumurtaların üzerine püskürtülürse yumurtalar açılmaz. Uygulanmış yaprağa bırakılan yumurtalar da açılmaz. Eğer erginler bitki koruma ürünü ile temas etmişlerse, bıraktıktan yumurtalar açılmaz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

CONCİD 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup 10A** olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **CONCİD 5 EC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplama uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 10A harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Kuvvetli alkali bitki koruma ürünler ile karıştırılmaz. Diğer bitki koruma ürünleri ve yaprak gübreleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.



Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU	10 A	AKARİSİT (Kırmızıörümcek İlacı)
-------	------	---------------------------------

50 g/l Hexythiazox

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA

ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.

MERKEZ: Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok.

Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa / ANTALYA

Tel: + 90 242 324 75 10-11 Faks: + 90 242 324 75 12

ÜRETİM TESİSİ:

BOR Karma Organize Sanayi Bölgesi

Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km 4 Nolu Yol No: 10 Bor / NİĞDE

Tel: +90 388 315 00 74-75 Faks: +90 388 315 00 73

ASTRANOVA TAR. TİC. ve SAN. A.Ş.
Antalya Kurumlar V.D.: 091 050 9362
Tel: 0242 324 75 10-11 Faks: 0242 324 75 12
Çağlayan Mah./Eski Lara Yolu 2049 Sk.
Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa/ANTALYA

Emine CEYLAN GÜNEŞ

08 -11- 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

