

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR:

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Şeker Pancarı	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	Çıkış sonrası 1. Uygulama 200 ml/da Şeker pancarı tam kotiledon döneminde ve yabancı otların 2-4 yapraklı döneminde iken uygulama yapılır.	90 gün
	Yabani hardal (<i>Sinapsis arvensis</i>)	2. Uygulama 200 ml/da İlk uygulamadan 7-10 gün sonra yaşayan ve tekrar çıkan yabancı otları kontrol etmek için kullanılır.	
	Dikenli yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>)	3. Uygulama 200 ml/da İkinci uygulamadan 7-10 gün sonra yaşayan ve tekrar çıkan yabancı otları kontrol etmek için kullanılır.	

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız ve az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLÇALAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasının sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

24 Temmuz 2024


ASTRANOVA
GILAMUS®

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	C1,5	K3,15	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	------	-------	-----------------------------

350 g/l Metamitron + 150 g/l Ethofumesate

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının içerisine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Soluma sonrası: Karışım solunmuş ise, kişi temiz havaya çıkarılmalı, solumuyor ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solumada güçlük var ise, oksijen verilmelidir. Acilen hekim çağırılarak girişimde bulunulmalıdır.

Cilt teması sonrası: Karışım cilde temas durumunda bulaşmış giysi ve ayakkabılarınızı çıkarınız bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır.

Göz teması sonrası: Karışımın göze temas etmesi durumunda acilen bol su ile en az 15 dakika yıkanmalıdır. Tahriş varsa doktora danışın.

Yutma sonrası: Yutulmuş ise, acilen tıbbi yardım almasını sağlayınız. Bilinç kapalı ise asla bir şey vermeyiniz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114


Osman ARI
Daire Başkanı

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER: Metamitron, Ethofumesate

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H411 Sulcul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P264 Elleçlemeden sonra ellerinizi bol su ve sabun ile iyice yıkayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanınız.

P391 Döküntüleri toplayınız.

P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Anılar için zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- +5 °C 'nin altında ve +35 °C 'nin üstünde depolamayınız.
- Uygulama esnasında bitki koruma ürününün bitişteki ürünlere sürüklenmemesine dikkat ediniz.
- Hazırlanan karışım bekletilmeden kullanılmalıdır.
- Rüzgarlı havalarda uygulama yapmayınız.
- **Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.**

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.


TAR. TIC. VE SAN. A.Ş.
Antalya Kurumlar V. D.: 091 050 9362
Tel: 0 242 324 75 10 - Fax: 0 242 324 75 12
Çağlayan Mh. Esentepe Yolu 2049 Sk. Kaplan A9
No: 116 ANURATPAŞA/ANTALYA
Fatma ERSÖZ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

GILAMUS® şekerpancarında tek yıllık geniş yapraklı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan bir herbisittir. **GILAMUS**® içerdiğinde bulunan iki farklı aktif madde sayesinde yaprakтан ve topraktan etkili olmaktadır. Herbisitin etkili olabilmesi için toprak nemi oldukça önemlidir. Şayet uygulamalar kuru toprağa yapılrsa herbisitin etkisi uygulamadan sonra meydana gelecek olan yağışlardan sonra görülmeye başlanır. **GILAMUS**® bölünmüş doz (split) uygulaması ile ardışık olarak 7-10 gün ara ile 3 uygulama şeklinde kullanılır. 1. Uygulamadan sonra ot çıkışı olmasa dahi 2. ve 3. uygulamalara devam edilmelidir.

Normal şartlar altında tüm şeker pancarı çeşitleri **GILAMUS**®'a çok iyi tolerans (uyum) gösterir. Pancar stres altında iken bitki koruma ürünlerine karşı çok hassastır. Sürekli yağın yağmurlardan sonra büyüme geriliği, ani sıcaklık değişimleri, daha önce atılan bitki koruma ürünleri, yüksek ışık, ilaçlama sırasındaki ortam sıcaklığı, kuvvetli rüzgâr, devamlı düşük ısılar, böcek ya da mantar zararı gibi diğer faktörler şekerpancarını strese sokabilir ve kotiledonlar zarar görebilir, yeterince büyüme gerçekleşmez. Bu durumlarda herbisit kullanımı durumu daha da kötüleştirir için stres altındaki şekerpancarına herbisit kullanılmaktan kaçınılmalıdır.

EKİM NÖBETİ: Hasattan sonra tüm bitkiler yetiştirilebilir. Uygun olmayan çevre koşullarında özellikle kışık buğday olmak üzere sonrasında ekilen bitkilere zarar verebilir. Şayet son uygulama ile bir sonraki ekilecek bitkinin ekim tarihi arasında ortalamanın altında yağış gerçekleşmişse buğday ekiminden önce derin toprak işleme önerilir. Sonrasında patates ve mısır ekilecekse derin toprak işleme önerilir. Tarlayı erken bozma durumunda 15-20 cm derinlikte bir toprak işleme yaptıktan sonra şeker ve hayvan pancarı ile patates ve mısır ekilebilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: **GILAMUS**® isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre **Grup C1,5 ve K3,15** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **GILAMUS**® un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup C1,5 ve K3,15 harici**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Karşıma ihtiyaç duyulması halinde uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	C1,5	K3,15	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	------	-------	-----------------------------

350 g/l Metamitron + 150 g/l Ethofumesate

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:**ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.**

Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok.
Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa / ANTALYA
Tel: +90 242 324 7510-11 Faks: +90 242 324 7512

ÜRETİM TESİSİ:

BOR Karma Organize Sanayi Bölgesi
Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km 4 Nolu Yol No: 10 Bor / NIĞDE
Tel: +90 388 315 0074-75 Faks: +90 388 315 0073



® ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş' nin tescilli markasıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

24 Temmuz 2024



Osman ARI
Daire Başkanı V.