

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve No : 18.03.2020/11613

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	✓ Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	15 g/100 l su Ergin, nimf	3 gün
Biber (Sera)	✓ Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	15 g/100 l su Ergin, nimf	3 gün
Şeftali	✓ Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	15 g/100 l su Ergin, nimf	14 gün
Hıyar (Sera)	✓ Yaprakbitleri (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>)	15 g/100 l su Ergin, nimf	3 gün
Kornişon (Sera)	✓ Yaprakbitleri (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>)	15 g/100 l su Ergin, nimf	3 gün
Kabak (Sera)	✓ Yaprakbitleri (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>)	15 g/100 l su Ergin, nimf	3 gün
Pamuk	✓ Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	20 g/da Ergin, nimf	21 gün
*Turuncgiller	✓ Turuncgil siyah yaprakbiti (<i>Toxoptera aurantii</i>) ✓ Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	8 g/100 l su Ergin, nimf	56 gün

* Turuncgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.



TERUYA® 50 WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUBU	29	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	----	--------------------------

% 50 Flonicamid

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıdalardan ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Soluma sonrası: Karışım solunmuş ise, kişi temiz havaya çıkarılmalı, solumuyor ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solumada güçlük var ise, oksijen verilmelidir. Acilen hekim çağırılarak girişimde bulunulmalıdır.

Cilt teması sonrası: Karışım cilde temas durumunda bulaşmış giysi ve ayakkabılarınızı çıkarın bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Ciltte tahriş ve kızarıklık varsa doktora danışın. Giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır.

Göz teması sonrası: Karışımın göze temas etmesi durumunda acilen bol su ile en az 15 dakika yıkanmalıdır. Tahriş ve kızarıklık varsa doktora danışın.

Yutma sonrası: Yutulmuş ise, acilen tıbbi yardım almasını sağlayın. Bilinç kapalı ise asla bir şey vermeyin.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Bilinen antidotu yoktur; belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANISMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

12 Kasım 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı :
Azami erakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER: Flonicamid

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



Uyarı kelimesi: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

✓ **H302** Yutulması halinde zararlıdır.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

- ✓ **P264** Elleçlemeden sonra ellerinizi bol su ve sabun ile iyice yıkayın.
- ✓ **P273** Çevreye verilmesinden kaçınınız.
- ✓ **P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- ✓ **P301+P312 YUTULDUĞUNDA:** kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- ✓ **P391** Döküntüleri toplayın.
- ✓ **P405** Kilit altında saklayın.
- ✓ **P501** İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.
- ✓ **EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- ✓ Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
- ✓ Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Boş bitki koruma ürün ambalajlarını herhangi bir amaç için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
- İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- +5 °C 'nin altında ve +35 °C 'nin üstünde depolamayınız.



Fatma ERSÖZ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

✓ **Domates (sera), Biber (sera), Hıyar (sera), Kornişon (sera), Kabakta (sera) Yaprakbitlerine karşı** Nisan ayından itibaren köşegenler doğrultusunda tarlaya girilerek 3-5 adımda bir bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucun da bir yaprağa düşen yaprakbiti sayısı 10-20 adet ise uygulamaya başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, ilaçlamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır. Yaprakbiti popülasyonu hava şartları ile çok ilgilidir. Kuraklık ve sıcaklık arttığında popülasyon aniden düşer. Bu husus ilaçlamalarda dikkate alınmalıdır.

✓ **Şeftalide Şeftali yaprakbiti karşı** çiçek tomurcuklarının belirmesinden, popülasyonun 3/4 'ü kanatlı forma dönüşüncüye kadar 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlandığında ilaçlama yapılmalıdır.

✓ **Pamukta Pamuk yaprakbitine karşı** fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, taraklanma döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında ilaçlamalara başlanması önerilir.

✓ **Turuncgilde Turuncgil siyah yaprakbiti ve Şeftali yaprakbitine karşı** Mart ve nisan aylarında en az 15 sürgün/ağaç bulaşıklığı saptandığında ilaçlama önerilir. Fidanlarda sürekli sürgün bulunduğundan, zararlı popülasyonu artış gösterdiğinde ilaçlama yapılmalıdır.

Bir sezonda birden fazla uygulamayınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

TERUYA® 50 WG adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre **Grup 29** olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına ait bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **TERUYA® 50 WG** 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 29 harici**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.



TERUYA® 50 WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUBU	29	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	----	--------------------------

% 50 Flonicamid

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlar da uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.

MERKEZ: Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok.

Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa / ANTALYA

Tel: +90 242 324 75 10-11 Faks: +90 242 324 75 12

ÜRETİM TESİSİ: BOR Karma Organize Sanayi Bölgesi
Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km 4 Nolu Yol No: 10 Bor / NIĞDE

Tel: +90 388 315 00 74-75 Faks: +90 388 315 00 73

© ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.'nin tescilli markasıdır.



12 Kasım 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.