

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 30.09.2010/7991

Genel Bilgiler: POTEĞON 20 SP sistemik etkilidir. Uygulamadan kısa bir süre sonra bitki bünyesine geçer ve etkisini 14 ila 21 gün korur. Aynı üretim periyodunda 2 den fazla uygulama yapılmamalıdır.

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	40 g/da Nimf, pupa, ergin	-
	Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	10 g/da Nimf, ergin	
	Yaprakpireleri (<i>Empoasca</i> spp.)	10 g/da Nimf, ergin	
Patates	Patates böceği (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	6 g/da Larva, ergin	7 gün
	Antepfıstığı yaprakpsillidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	20 g/100 l su Ergin, nimf	7 gün
Elma	Elma yeşil yaprakbiti (<i>Aphis pomi</i>)	20 g/100 L su Ergin, nimf	14 gün
Karpuz	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	25 g/da Ergin, nimf	7 gün
Tütün	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	10 g/da Nimf, ergin	10 gün
Şeftali	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	25 g/100 l su (Nimf, ergin)	14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulama tamamlandıca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız ve az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmayın. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

POTEĞON® 20 SP hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

Pamukta Tütün beyazsineği: Beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğu uygulamaya başlanmalıdır.


Pamuda Pamuk Yaprakbiti: Fide döneminde seyreltmeden sonra % 50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulamaya başlanmalıdır.

Pamukta Yaprakpireleri: Sürveylerde 50 da'lık bir pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpilesi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Patatesde Patates böceği: Tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, zararlıların yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (4.dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle karşı uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebileceğinden, uygulama gerekmez.

Antepfıstığında Antepfıstığı psillidi: Haftalık olarak 100 bilesik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Elmada Elma yeşil yaprakbiti: Vejetasyon süresince 100 sürgünden 15'inde bulaşıklık olursa uygulama yapılmalıdır.



Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

28 Ağustos 2025



POTEĞON® 20 SP

Suda Çözünen Toz (SP)

GRUBU	4A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
-------	----	--------------------------

% 20 Acetamiprid

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıdalardan ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Hareketlerde uyuşukluk, adale kasılmaları, denge bozukluğu, solunum azalışı, gözyaşı, sümük artışı.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Soluma sonrası: Karışım solumuş ise, kişi temiz havaya çıkarılmalı, solumuyor ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solumada güçlük var ise, oksijen verilmelidir. Acilen hekim çağırılarak girişimde bulunulmalıdır.

Cilt teması sonrası: Karışım cilde temas durumunda bulaşmış giysi ve ayakkabılar çıkarıldıktan sonra bol su ile en az 15 dakika yıkanmalıdır. Giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır.

Göz teması sonrası: Karışımın göze temas etmesi durumunda acilen bol su ile en az 15 dakika yıkanmalıdır.

Yutma sonrası: Yutulmuş ise, acilen tıbbi yardım alınmasını sağlayınız. Bilinç kapalı ise asla bir şey vermeyiniz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidot yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net Miktar:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Acetamiprid

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



Uyarı kelimesi: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P201 Kullanmadan önce özel talimatları edinin.

P202 Kullanmadan önce tüm güvenlik önlemlerini okuyun ve anlayın.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.

P264 Elleğmeden sonra ellerinizi bol su ve sabun ile iyice yıkayınız.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P281 Gerekli kişisel koruyucu ekipmanı kullanınız.

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız.

P308+P313 Maruz kalma veya şüphelenilen durumda: Tıbbi yardım alın.

P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimini arayınız.

P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P405 Kilitleyerek saklayınız.

P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- +5 °C 'nin altında ve +35 °C 'nin üstünde depolamayınız.
- Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapmayınız.
- Uygulamalar sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Uygulama yapıldıktan sonra 6 saat içerisinde yağmur yağarsa uygulama tekrarlanmalıdır.
- Tavsiye dozunda fitotoksik değildir.


TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Yüreğir Vcd. No:1 050 9362
Tel: 0322 603 1111 Fax:0 368 314 00 73
Onur Mah. Okul Cad. Kızı İş Mrk.
A1 Blok No: 1/602 SEYHAN/ADANA

Fatma ERSÖZ

Karpuz Şeftali yaprakbiti: Uygulama zamanını tespit etmek amacıyla Nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. 20-40 yaprakta lupla yapılan sayımlarda yaprak başına ortalama 10-20 adet ise uygulamaya başlanır. Bununla birlikte parazitoit ve predatör varlığı gözlenerek uygulamaya karar vermeden önce faydalıların etkinliklerine bakılmalıdır.

Tütünde Şeftali yaprakbiti: Bir yaprakta ortalama 25 adet nimf+ergin görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir. Fide döneminde zararlı görülünce uygulama yapılır.

Şeftalide şeftali yaprakbiti: Çiçek tomurcuklarının belirmesinden, popülasyonun 3/4'ü kanatlı forma dönüşüncüye değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlanıldığında uygulama yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: POTEĞON® 20 SP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup 4A** olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **POTEĞON® 20 SP**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 4A harici**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.



POTEĞON® 20 SP

Suda Çözünen Toz (SP)

GRUBU	4A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
-------	----	--------------------------

% 20 Acetamiprid

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
MERKEZ: Onur Mah. Tekel Cad. Kıza İş Merkezi Sit. A1 Blok No:1 İç Kapı: 602 Seyhan/ADANA
Tel: +90 322 503 74 75 Faks: +90 322 457 10 88
ÜRETİM TESİSİ: BOR Karma Organize Sanayi Bölgesi
Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km 4 Nolu Yol No: 10 Bor / NIĞDE
Tel: +90 388 315 00 74 -75 Faks: +90 388 315 00 73

® ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.'nin tescilli markasıdır.



28 Ağustos 2025
ZİRAAT BAKANLIĞI
MÜHÜR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.