

İmal Tarih :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve No : 28.11.2014/9935

GENEL BİLGİLER: YEKDOZ WG, sistemik ve kontak özelliklere sahip bir fungisittir. Ürünün bileşimine giren iki etkili maddeden biri olan "**Cyprodinil**" methionin biyosentezini engeller, "**Cyprodinil**" yapraklar ve meyveden süratle bünyeye alınır. Bitkide yukarıya doğru ve yaprağın bir yüzeyinden diğer yüzeyine iyi bir şekilde taşınır. Ürünün bünyesinde bulunan diğer etkili madde "**fludioxonil**" kontak etkili olup, esas itibarıyla konidilerin çimlenmesini ve fungusit miselinin penetrasyonunu engeller.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ*	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	50 g/100 l su	7 gün
Domates	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 g/100 l su	7 gün
Biber (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 g/100 l su	7 gün
Hıyar (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 g/100 l su	7 gün
Kornişon (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 g/100 l su	7 gün
Kiraz	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>)	35 g/100 l su	7 gün
Çilek	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 g/100 l su	7 gün
Patlıcan (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 g/100 l su	7 gün

(*)Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaç su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız ve az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

ASTRANOVA
YEKDOZ® WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grubu	D1:9	E2:12	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	-------	-------------------------

% 37.5 Cyprodinil + % 25 Fludioxonil

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma sonrası: Karışım solunmuş ise, kişi temiz havaya çıkarılmalı, solumuyor ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solumada güçlük var ise, oksijen verilmelidir. Acilen **hekim çağırılarak** girişimde bulunulmalıdır.

Cilt teması sonrası: Karışım cilde temas durumunda bulaşmış giysi ve ayakkabılarınızı çıkarınız bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır.

Göz teması sonrası: Karışımın göze temas etmesi durumunda acilen bol su ile en az 15 dakika yıkanmalıdır.

Yutma sonrası: Yutulmuş ise, acilen **tıbbi yardım almasını** sağlayın. Bilinç kapalı ise asla bir şey vermeyin.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Net Miktarı :
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER: Cyprodinil, Fludioxonil

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Ürün ile temastan sakının.
- Boş ürün ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- +5 °C 'nin altında ve +35 °C 'nin üstünde depolamayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

ASTRANOVA
TAR. TİC. VE SAN. A.Ş.
Antalya Kurumlar Y. D.: 091 050 9362
Tel: 0.242 242 75 10 • Fax: 0.242 324 75 12
Çağlayan Mh. Esim Lara Yolu 2049 Sk. Kaplan Ar.
No: 10 • MURATPAŞA/ANTALYA

Fatma ERSÖZ

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

4 Mart 2024

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:**Bağ Kurşuni küf:**

Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde;

1. ilaçlama: Tanelerin olgunluk başlangıcında,
2. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgelerinde;

1. ilaçlama: Çiçeklenmeden hemen önce,
2. ilaçlama: Kapalı salıkm döneminde,
3. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Domates Kurşuni küf: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. İlaçlamalar 10 gün arayla 2-3 uygulama yapılır.

Biber (sera) Kurşuni küf : İlaçlamalar bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

Hıyar-Kornişon (sera) Kurşuni küf: İlaçlamaya hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. 10-12 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

Kiraz Sert çekirdeklielerde çiçek monilyası: 1.ilaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte), 2. ilaçlama: Tam çiçeklenme döneminde (%90-100 çiçekte) yapılır.

Çilek Kurşuni küf: 1. İlaçlama: ilk çiçeklerin %10'u açınca 2. İlaçlama: Çiçeklerin % 50'si açınca 3. İlaçlama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılır.

Patıcan (sera) Kurşuni küf : İlaçlamaya hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır. 10-12 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

Bitki Tahammülü: Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında tavsiye edildiği kültür bitkileri üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi yoktur. Tereddüt halinde, hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

YEKDOZ® WG adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre **Grup D1:9** ve **E2:12** olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip Bitki Koruma Ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, **YEKDOZ® WG'** nin aynı üretim sezonu içerisinde toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup D1:9 ve E2:12 harici**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.



Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grubu	D1:9	E2:12	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	-------	-------------------------

% 37.5 Cyprodinil + % 25 Fludioxonil

FİRMA BEYANI: Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.

MERKEZ: Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok.

Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa / ANTALYA

Tel: +90 242 324 75 10-11 Faks: +90 242 324 75 12

ÜRETİM TESİSİ: BOR Karma Organize Sanayi Bölgesi

Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km 4 Nolu Yol No: 10 Bor / NIĞDE

Tel: +90 388 315 00 74-75 Faks: +90 388 315 00 73



4 Mart 2024
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.