

# IMI toleranslı clearfield ayçiçeği çeşitlerinde zor otların güvenli çözümü



+90 388 315 0074-75

[www.astranova.com.tr](http://www.astranova.com.tr)

[info@astranova.com.tr](mailto:info@astranova.com.tr)

# SIMIRNA-X

40 g/l Imazamox

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

SIMIRNA-X yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkinin her tarafına taşınır. Yabancı otların gelişmesini engeller ve 3-4 hafta içerisinde ölümlerine neden olur.

### Imidazolinone toleranslı Clearfield Ayçiçeği çeşitlerinde uygulama zamanı ve şekli:

Temel problem Canavar otu ise, ayçiçeğinin 6-8 gerçek yapraklı döneminde; temel problem domuz pıtrağı ve etikette belirtilen diğer yabancı otlar için ise 4-6 gerçek yapraklı döneminde yapılmalıdır. Uygulamada yelpaze tipi püskürtme yapan memeler kullanılmalı ve uygulama anında memeler ayçiçeği bitkilerinin tepesinden 40-50 cm yükseklikte olmalıdır. Dekara 20-30 litre su kullanılmalıdır. Karışım damlacıkları otlar üzerinde kurulduktan sonra yağın yağmurla yıkanmaz. Uygulama döneminde hava sıcaklığının 10°C üzerinde seyretmesi ilacın etkinliğini artırır.

Bitki	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
IMI Toleranslı Clearfield Ayçiçeği Çeşitleri	Canavar otu ( <i>Orabanche</i> spp.) Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )	125 ml/da Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı, yabancı otların 8-10 yapraklı döneminde çıkış sonrası uygulanır	—
Bezelye	Çobançantası ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Ballıbaba ( <i>Lamium amplexicaule</i> ) Kuş otu ( <i>Stellaria media</i> ) Şeytan elması ( <i>Datura stramonium</i> ) Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Şahtere ( <i>Fumaria officinalis</i> ) Çoban değneği ( <i>Polygonum aviculare</i> ) Sarmaşık çoban değneği ( <i>Polygonum convolvulus</i> ) Yapışkan otu ( <i>Setaria verticillata</i> ) Isırgan otu ( <i>Urtica urens</i> ) Acı yavşanotu ( <i>Veronica cymbalaria</i> ) Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )	100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.	—
Soya	Sütleğen ( <i>Euphorbia</i> spp.) Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> ) Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Yapışkan otu ( <i>Setaria verticillata</i> )	125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.	—
Fasulye	Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Yapışkan otu ( <i>Setaria verticillata</i> ) Şahtere ( <i>Fumaria officinalis</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Şeytan elması ( <i>Datura stramonium</i> ) Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Domuzpıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> ) Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> )	100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.	—
Yonca	Küsküt ( <i>Cuscuta</i> spp.)	125 ml/da Yoncanın 10-12 yapraklı dönemine uygulanır.	—
Yer Fıstığı	Yapışkan otu ( <i>Setaria verticillata</i> ) Şahtere ( <i>Fumaria officinalis</i> ) Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.	—
	Çoban değneği ( <i>Polygonum aviculare</i> ) Sarmaşık çoban değneği ( <i>Polygonum convolvulus</i> ) Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> ) Çukurova fener otu ( <i>Physalis angulata</i> )	125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.	—

**Uyarı:** Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

**Merkez:** Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok. Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa / Antalya

**Tel:** +90 242 324 75 10-11 Faks: +90 242 324 75 12

**Üretim Tesisi:** Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Ankara Astarlı Üzeri 9. Km 4 Nolu Yol No: 10 Bor / NİĞDE / +90 388 315 0074-75

+90 388 315 0074-75

www.astranova.com.tr

info@astranova.com.tr

